

Concept persbericht

Zoetermeer, 09 december 2022

NIEUWE AANBEVOLEN RASSEN VAN SNIJMAÏS, KORRELMAÏS EN CORN COB MIX

Er zijn 11 nieuwe maïsrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2023. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin BO Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen.

Snijmaïis, zeer vroege en vroege rassen

LG 31.206 Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F)
Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

Purpose Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F)
Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

KWS Curacao Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D)
Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur

Around Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D)
Vertegenwoordiger: euroCORN GmbH, Viersen

Snijmaïis, middenvroeg en middenlate rassen

Meluseen Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F)
Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

CS Luxuri Kweker: Lidea France S.A.S., Lescar (F)
Vertegenwoordiger: Caussade Semences Benelux, Doornik

Gwendoleen Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F)
Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

P8153 Kweker: Pioneer Overseas Corporation., Johnston (USA)
Vertegenwoordiger: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Breda

Glutexo Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D)
Vertegenwoordiger: DSV zaden Nederland B.V., Ven-Zelderheide

Korrelmaïis en corn cob mix

KWS Polento Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D)
Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur

Privat Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D)
Vertegenwoordiger: euroCORN GmbH, Viersen (D)Kweker: euroCORN

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81335633.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2023".

Tabel 1a. Aanbevelende Rassenlijst 2023 - Snijmais, zeer vroege en vroege rassen

Aanbevolen rassen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2017 t/m 2022 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Helminthosporiu m tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾		
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg																				
N	Asgaard	8,5	8	*	7	8	*	7	95	8,5	40,9	111	107	105	101	93	94	6		
	MAS 08F	7	7	*	7	8,5	*	7,5	89	8	40,4	109	106	102	102	93	94	6		
	Papageno	7,5	7	*	6,5	7,5	*	8	100	8	39,5	107	104	102	101	100	101	5		
	LG 31.206	7,5	7,5	*	7,5	7,5	*	7	97	8	38,6	105	104	103	103	101	103	3		
	LG 31.205	7,5	7,5	*	8,5	6,5	*	6	106	8	38,4	104	104	103	100	99	100	6		
	LG 31.211	7,5	7,5	*	8,5	8	*	7,5	96	8	38,4	104	104	103	102	97	99	6		
	LG 31.218	7,5	7,5	*	8	8	*	8	98	8	37,9	103	102	101	101	97	98	6		
	AgroMilas	7,5	7,5	*	8	8	*	7,5	100	7,5	37,8	103	99	99	100	98	98	5		
	N	Emeleen	7,5	8	*	8,5	7	*	6,5	106	7,5	37,8	102	100	100	100	101	101	4	
	N	KWS Johaninio	8	7	*	7,5	8	*	8,5	96	7,5	37,8	102	102	101	99	99	99	4	
N	Benco	7	7	*	7,5	7,5	*	7,5	100	7,5	37,7	102	97	95	101	101	102	5		
	Purpose	7,5	7,5	*	7,5	7	*	6	106	8	37,7	102	101	101	100	100	100	3		
N	LG 31.207	8	7,5	*	8,5	7	*	6,5	106	8	37,6	102	99	98	100	101	101	6		
	P8057	8	7,5	8,5	8	8	8,5	7	96	8	37,1	101	102	101	101	94	95	6		
	LG 31.214	7,5	7,5	*	8,5	7	*	7	97	8	36,8	100	99	99	101	100	102	6		
	Smoothi CS	7,5	7,5	*	7	8	*	8	100	7	36,8	100	98	97	97	97	94	6		
	KWS Saltare	7	7,5	*	7,5	7,5	*	8	102	7,5	36,7	99	98	99	100	100	99	5		
	SY Skandik	7,5	8	*	7,5	8,5	*	6,5	97	7,5	36,6	99	101	103	100	99	99	6		
	N	KWS Curacao	8	7,5	*	7,5	8	*	8,5	105	7	36,5	99	96	97	98	103	101	3	
	N	SY Hummer	7	7,5	*	7,5	7,5	*	8,5	99	7,5	36,5	99	100	100	100	98	98	4	
	N	LG 31.219	8	8	*	8	8	*	7	104	8	36,5	99	101	101	100	99	99	6	
		SY Invictus	8	8	*	7	6,5	*	6,5	104	7	35,8	97	94	94	99	104	103	4	
N	Benedictio KWS	7,5	7	*	8	8	*	8,5	102	7	35,3	96	94	95	99	100	99	6		
	Farmodena	7,5	6	*	6,5	8	*	7	97	7,5	35,1	95	100	102	97	100	98	6		
	Vicente	7	8	*	6,5	8	*	7,5	93	7,5	35,0	95	99	100	102	94	96	6		
	SY Telias	7	7	*	7	7,5	*	8	94	7	34,9	95	101	102	99	99	98	6		
	N	Around	7,5	7	*	8	8	*	7,5	96	8	34,5	93	98	101	98	100	98	4	
	Privat	7,5	7	*	7	7,5	*	6,5	97	7,5	34,3	93	99	101	99	102	100	6		
	100=..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000									315				36,9	389	380	992	22,3	22,1	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 2, middenvroeg/middenlate rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
 - ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
 - ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
 - ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
 - ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 1b. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2023 - Snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen

Meerjarig onderzochte rassen - (nog) niet aanbevolen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2017 t/m 2022 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Helminthosporiu m tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalt e gehele plant in	Drogestofgehalt e	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaïs, zeer vroeg en vroeg																		
	MGM438175	7,5	7,5	*	5	8,5	*	7,5	95	8	40,3	109	110	*	102	96	97	2
	KXC0032	6,5	6	*	7	8	*	9	102	7,5	38,7	105	101	*	99	101	100	2
	EW2969	8	8	*	9	8,5	*	7,5	102	7,5	37,9	103	103	*	99	101	100	2
	LZM171/74	8	8	*	8,5	7	*	6,5	101	8	37,9	103	99	*	101	99	100	2
	SA0060	7,5	7,5	*	3,5	7	*	6,5	97	7,5	37,8	102	104	*	100	98	98	2
	1076A00101	8	8	*	5,5	8,5	*	7,5	105	6,5	37,3	101	92	*	98	101	99	2
	DKC3218	8	8	*	9	8	*	8,5	100	7,5	36,8	100	90	91	99	100	98	3
	LZM171/76	7	7,5	*	6	7	*	7	103	8	36,1	98	102	*	102	103	105	2
	Farmaxus	6,5	7	*	7,5	7,5	*	7	100	7,5	36,0	98	97	98	99	99	98	4
	SML0310	7	6,5	*	7,5	8,5	*	8,5	100	7,5	35,8	97	97	*	99	105	103	2
	SG186	7,5	7	*	8	7,5	*	9	100	7	33,5	91	93	*	99	101	99	2
100=..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000									315	36,9			389	380	992	22,3	22,1	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 2, middenvroeg/middenlate rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
- ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
- ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
- ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
- ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 2a. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2023 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen
Aanbevolen rassen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2017 t/m 2022 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Helminthospori um tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalt e gehele plant	Drogestofgehalt e	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmaïs, middenvroeg en middenlaat																		
N	Meluseen	8,5	9	*	7,5	8,5	*	6,5	104	7	39,1	107	103	98	100	104	104	3
N	CS Luxuri	7,5	7	*	7,5	7,5	*	7,5	97	8	38,6	106	105	102	101	97	98	3
	Genialis KWS	8	8	*	8,5	8,5	8	8	93	8	38,1	105	103	105	100	98	98	6
	LG 31.245	6,5	8	*	7,5	7,5	*	6	108	7,5	37,8	104	99	97	99	101	101	5
	Farmerino	8	7,5	*	7,5	7	*	7	100	7,5	37,7	104	105	102	99	93	92	6
N	Gwendoleen	7	7,5	*	8	8,5	*	8	108	7,5	37,6	103	102	99	100	103	103	3
N	P8153	6,5	8	*	7	7,5	*	7,5	105	7,5	37,4	103	94	92	99	102	101	3
N	Greatful	7,5	8	*	7,5	7	*	8,5	98	7,5	37,4	103	103	102	100	100	100	4
	Milkmax	7	7	*	7	7	*	7,5	104	7	37,1	102	98	95	98	99	97	5
	Torres	7,5	7,5	7	8	7,5	8	8	100	8	36,8	101	103	102	101	96	97	6
	LG 31.235	8	8,5	*	8	7,5	7,5	7	98	7,5	36,7	101	95	95	101	99	99	6
	Digital	8	8,5	*	7	7	*	7	96	7,5	36,6	101	102	102	99	100	99	6
N	Glutexo	8	7,5	*	6,5	7,5	*	7,5	96	7	36,5	100	100	98	99	101	100	3
	P8333	6	6,5	*	7,5	6,5	*	7	105	6,5	36,3	100	94	92	98	100	98	6
N	SY Nomad	7,5	9	*	8,5	9	*	6,5	106	7	36,2	99	95	96	101	102	103	4
	Farmueller	7,5	7,5	*	6,5	8	*	7	99	7	35,9	99	100	100	99	102	101	6
	SY Dakini	6,5	6,5	*	8	8,5	*	6	102	7	35,9	99	93	93	103	99	102	5
	Farmoritz	8	8,5	*	7,5	7,5	*	6	100	7,5	35,5	98	105	106	100	100	100	6
	Sudress	7,5	8,5	*	6,5	7	*	7,5	100	6,5	35,2	97	94	94	98	100	98	5
	EC Gisella	7	7,5	*	7	8	*	7,5	100	7	34,4	94	98	100	98	102	100	6
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000									319	36,4			386	377	992	22,7	22,5	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 1, zeer vroege/vroege rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
- ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
- ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
- ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
- ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 2b. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2023 - Snijmaï's - Midden vroege en midden late rassen

Meerjarig onderzochte rassen - (nog) niet aanbevolen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2017 t/m 2022 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Helminthosporiu m tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% ds	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaï's middenvroeg en middenlaat																		
	SA1039	7,5	8,5	*	7	9	*	5,5	106	6,5	39,7	109	102	100	102	103	2	
	LZM271/45	7,5	8	*	6,5	7,5	*	6,5	104	7	39,4	108	104	100	101	101	2	
	LG 32.257	7,5	7,5	*	7,5	8	*	8	106	7,5	39,2	108	109	100	105	106	2	
	LG 31.231	6,5	7,5	*	7	8,5	*	8	108	7	39,1	108	101	100	102	102	2	
	Darcy	6,5	8	*	7	6,5	*	8	101	7	38,8	107	104	98	100	98	2	
	DKC3204	8	8	*	7,5	8,5	*	7,5	102	7,5	38,7	106	99	94	100	97	97	3
	ESZ9207	6,5	6,5	*	6,5	8	*	7,5	108	7,5	37,7	104	101	98	103	100	2	
	Kimnich	7	8	*	9	8	*	8	103	7,5	37,6	103	95	99	99	98	2	
	1080A84301	5,5	6,5	*	8	5,5	*	8	102	7	37,0	102	95	99	104	103	2	
	1082A19501	8,5	8,5	*	8	6,5	*	6,5	105	6,5	36,3	100	97	99	104	103	2	
	1083A16801	7	8,5	*	7,5	7	*	6,5	106	7	36,3	100	88	98	103	101	2	
	ECK0423	7	5,5	*	7	7	*	8,5	100	7	34,7	95	92	99	102	101	2	
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									319	36,4		386	377	992	22,7	22,5		

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 1, zeer vroege/vroege rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waarderung staat.
- ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
- ³⁾ De vroegheid van vrouw elijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
- ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
- ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras w orden aanbevolen. Betrouw baarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten w orden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 3. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2023 - Korrelmaïs en corn cob mix

 Gemiddelde resultaten over de jaren 2017 t/m 2022 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Helminthosporiu m tolerantie	Oogstbaarheid ³⁾	Stengelrot resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Plantlengte	Korrel			Aantal jaren in onderzoek ⁶⁾
										Vochtgehalte ⁴⁾	Drogestof gehalte	Drogestof opbrengst ⁵⁾	
AANBEVOLEN RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix													
N	KWS Curacao	9	6,5	*	6,5	6,5	7	*	107	24,8	103	96	4
N	KWS Polento	8,5	7,5	*	6	6,5	6	*	106	25,3	102	97	3
N	Ashley	8,5	8	*	7	7	7,5	*	103	26,5	101	102	4
N	SY Calo	7	7	*	7	7	7,5	*	91	26,9	100	101	4
	Megusto KWS	7,5	9	*	7	6,5	8	6,5	96	26,9	100	100	6
	Genialis KWS	8,5	7,5	7,5	8,5	8	8	8	93	27,1	100	98	6
	LG 31.219	7	8	*	7,5	7	7,5	8	104	27,2	100	101	5
	LG 31.225	7,5	8	*	8	8	7,5	7	98	27,8	99	101	6
	KWS Corazon	8	7,5	*	8	8	8	7,5	102	27,8	99	101	6
N	Privat	6,5	7	*	7,5	7,5	7,5	*	98	29,4	97	107	3
	KWS Gustavius	7	6	*	8,5	8	8,5	8	96	29,8	96	100	5
N	Farmoritz	6	7	*	7,5	7,5	7,5	*	99	30,2	96	107	4
N	Farmueller	7	6,5	*	7,5	7	8	*	98	30,8	95	106	4
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix - (nog) niet aanbevolen													
	KXC1304	8	8	*	7,5	7	8,5	*	98	22,7	106	101	2
	Amarola	9	7	*	6,5	6,5	7,5	*	109	24,3	104	97	2
	KXC1307	9	8,5	*	6	5,5	8	*	92	24,8	103	97	2
	KWS Giulio	8,5	7,5	*	8	8	6,5	*	102	25,1	102	95	2
	KWS Tesoro	8,5	7	*	6,5	6,5	7,5	*	109	25,2	102	104	2
	KXC0018	9	7	*	7	7	7,5	*	109	25,7	102	98	2
	SA0060	6	7,5	*	7	6,5	7,5	*	97	26,0	101	100	2
	LID1015C	7	6,5	*	6	6,5	6	*	104	26,0	101	94	2
	KWS Emporio	8	7	*	6,5	6,5	8	*	108	26,4	101	101	2
	SML0331	7,5	7	*	8	8,5	7,5	*	102	26,7	100	101	2
	X75R464	8	7	*	6	5,5	8	*	94	27,0	100	100	3
	Farmactos	7	7	*	8,5	8	8,5	*	101	27,0	100	98	2
	ES Blackjack	7,5	7,5	*	7,5	7,5	8	*	110	27,3	100	100	2
	KXC0017	9	7,5	*	7,5	7,5	8	*	95	27,6	99	100	3
	X80R591	8	6,5	*	6,5	6	8,5	*	98	28,4	98	100	2
	BRV2361B	8	6,5	*	7,5	6,5	8	*	95	29,0	97	100	3
	1082A19501	6	6,5	*	7,5	7,5	8	*	106	29,4	97	102	2
	Sumumba	7	7	*	8	7,5	8	*	100	30,1	96	103	2
100=...resp. in cm, %, ton/ha									323	73,0		10,8	

Tabel 4. Rassenlijst 2023 - Positieve Lijst van rassen geschikt voor uitzaai op Maiskopbrand besmette percelen. Rassen gerangschikt op volgorde van geschiktheid.

Snijmais Zeer vroeg / Vroege rassen	Snijmais Midden vroege / Midden late rassen	Korrelmais / CCM
Smoothi CS P8057 MAS 08F SY Skandik SY Telias Vicente Benco LG 31.206	Genialis KWS SY Dakini Meluseen Farmerino SY Nomad Milkmax	Genialis KWS Megusto KWS KWS Gustavius SY Calo

Rassen op positieve lijst hebben minimaal gedurende 2 jaar een aantasting laten zien van 0 tot maximaal 3%.

Bij deze lage percentages is op maiskopbrand besmette percelen een volwaardig mais gewas te telen.

Om verspreiding naar andere percelen te voorkomen moeten nog wel de hygiëne regels in acht worden genomen.